

## 1984年下半年各国批准的药物简介 (一)

**编者按:** 本文介绍的信息是由各国药政管理部提供的, 详细资料可向世界卫生组织 (WHO) 索取。某些特殊类别的产品如造影剂和放射药品删略。顺序是按照国际非专有药名排列, 后附商品名称及生产药厂名称。选登的药物只供参考, 并无推荐之意。

下面是参加国际情报系统的一些国家于一九八四年下半年注册的新化合物, 现简述如下:

醋丁洛尔 (醋丁酰心安), Acebutolol (Molson; Bayer), 西班牙, 包衣片 200 mg。选择性 $\beta$ -肾上腺素受体阻断剂, 适用于动脉压过高和其他功能性心血管疾病。禁忌症、注意事项和副作用同其他 $\beta$ -受体阻断剂。

阿昔洛维, Aciclovir (Zovirax; Wellcome)(Cycloviran; Sigma-tau), 意大利, 注射用粉末, 250mg/安瓿。抑制 DNA 聚合酶的抗病毒药, 适用于免疫缺乏性患者的单纯性疱疹感染的治疗。过敏体质者禁用。肾功能不全者需减量。注射液溢出血管时可导致严重的局部炎症反应和溃疡。孕妇和哺乳期妇女的安全性尚未确定。

阿西莫司, Acipimox (Olbetam; Farmitalia-Carlo Erba), 意大利, 胶囊 150mg, 250mg。降血脂药。禁用于过敏患者以及胃溃疡患者。偶可引起轻度胃功能失调、头痛和无力。孕妇和哺乳期妇女的安全性尚未确定。

羟氨苄青霉素+棒酸 (Augmentan; Beecham), 西德, 粉针剂, 500mg+50mg/安瓿, 500mg+100mg/安瓿, 1g+200mg/安瓿, 2g+200mg/安瓿。 $\beta$ -内酰胺抗生素和内酰胺酶抑制剂的复合制剂。适用于敏感菌引起的感染, 特别是肺和泌尿道、腹部、皮肤、软组织和关节感染。亦用于大范围腹部手术后感染的预防。过敏患者禁用, 孕妇和哺乳期妇女、具Pfeiffer氏疾

病或淋巴性白血病的患者应减量。已报道的副作用包括变态反应、皮疹, 偶有胃肠道功能失调。

Amsacrine (Amsidine; Parke-Davis) 英国, (Amsidyl; Parke-Davis) 新西兰, 注射液, 50mg/ml; 2 ml。细胞抑制剂, 适用于成人急性白血病的诱导和维持。先天性骨髓抑制患者禁用。孕妇的安全性尚未确定。注意点和副作用同其他抗白血病药。

苯哌唑酮, Benperidol (Psicoben; Ravizza), 意大利, 片剂: 0.5mg, 2mg; 油溶液: 100mg/瓶; 注射液: 1mg/安瓿。丙基苯甲酮类安定药, 适用于严重行为失调的治疗。禁用于过敏患者, 具锥体外症状的患者, 以及酒精中毒、安定药、镇痛药和其他精神用药所引起的严重 CNS 抑制患者。在治疗期间, 患者应戒酒。主要副作用有锥体外症状和迟发性运动障碍。

倍他索洛尔, Betaxolol (Kerlon; Lirca), 意大利, 片剂: 20mg。作用持久的心脏选择性 $\beta$ -肾上腺素受体阻断剂, 适用于原发性高血压, 禁忌症、注意事项和副作用同其他类似药。

苯扎贝特, Bezafibrate (Reducteol; Morgenes), 西班牙, (Bezalip; Boehringer Mannheim), 新西兰, 片剂: 200mg。安妥明类似物, 适用于食物疗法无效的高脂血症。孕妇、哺乳期妇女以及具有严重肝功能紊乱和肾病综合症的患者禁用, 可发生睡眠不良和肌肉疼痛, 长期治疗须进行血液学监护。

布非洛尔, Bufetolol (Adobiol; Menarini), 意大利, 包衣片 5mg、10mg、20mg。β-肾上腺素受体阻断剂, 适用于冠脉功能不全、室性期外收缩、动脉压升高和运动过度—肌力过度性心病综合症。禁忌症、副作用和注意点同其他β-受体阻断剂。

头孢哌酮, Cefoperazone (Cefomal; Menarini), 意大利。(Cefobid; Pfizer)。粉针剂, 250mg、500mg、1g、2g/安瓿。非肠道使用的广谱头孢菌素类抗生素, 适用于由敏感菌引起的呼吸道和泌尿生殖道、骨关节、皮肤和软组织感染。禁忌症、注意点和副作用同其他头孢菌素类药物。

噻甲羧肟头孢菌素, Ceftazidime (Fortum; Glaxo), 新西兰, 粉针剂, 250mg、500mg、1g、2g。头孢菌素类抗生素, 适用于由敏感菌引起的感染, 特别是呼吸道、泌尿生殖道和胃肠道、骨关节、皮肤和软组织感染。

头孢替唑, Ceftezole (Alomen; Schering), 意大利, 粉针剂, 0.5g、1g/安瓿。头孢菌素类抗生素, 适用于由敏感菌引起的感染, 特别是呼吸道、泌尿生殖道和软组织感染。禁忌症、注意点和副作用同其他头孢菌素类。

头孢三嗪, Ceftriaxone, (Rocephin; Roche), 荷兰, 粉针剂, 0.25g、0.5g、1.0g、2.0g/安瓿。头孢菌素类抗生素, 其血浆半衰期为8小时, 适用于由敏感链球菌、葡萄球菌、嗜血流感杆菌、脑膜炎球菌、淋球菌和其他革兰氏阳性菌引起的感染, 也可以预防性地用于外科感染。对头孢菌素类过敏者禁用。与青霉素类之间可发生交叉过敏性。对孕妇和哺乳妇的安全性尚未建立。副作用有胃肠道紊乱、皮疹、血液检验值异常并偶可发生头痛和眩晕。不与利多卡因一起肌注时疼痛。

蛙皮素Ceruletide (Ilatest; Bracco), 意大利, 粉针剂, 20mg/安瓿。(Takus; Carlo Erba), 英国, 粉针剂 5mg/安瓿, 30mg/安瓿, 作用与促胰酶素近似的十肽。适用于胰腺功能失调的诊断, 急性胰腺炎、胆石病、机械性胆管梗阻、严重心血管功能不全和可疑性十二指肠梗阻的患者禁用。孕妇禁用。高剂量时有胃肠道反应的报导。

木瓜凝乳蛋白酶, Chymopapain (Disca; Travenol), 西德, 粉针剂20mg/安瓿, 蛋白水解酶, 适用于保守治疗无效时的椎间盘突出, 脊髓和椎骨脱离症除外。过敏患者以及以前用本药治疗过的患者禁用。孕妇、16岁以下的儿童、或具有腱鞘炎的患者禁用。副作用有过敏、过敏性反应, 偶有骨炎和关节盘炎。

环匹罗司氨乙醇, Ciclopirox Olamine (Micoxolamina; Dompe), 意大利, (Miclast; Lifefarma), (Brumixol; Bruschetti)。霜剂1%, 溶液剂1%, 洗剂1%。抗真菌剂, 适用于皮肤真菌和阴道念珠球菌感染的局部治疗。过敏患者禁用。对孕妇和幼儿的安全性尚未确定。不适合眼科使用。

西诺沙星(新恶酸), Cinoxacin (Cinobactin; Lilly), 澳大利亚, 胶囊200mg、500mg。(Cinodac; Lilly), 胶囊500mg。杀菌性抗菌药, 适用于敏感菌引起的尿路感染的全身治疗, 禁用于过敏患者, 孕妇和哺乳妇、儿童和青春期, 器质性肾功能障碍者须减量, 副作用有胃肠道反应和变态反应。

Clebopride+Silicone聚硅氧烷(硅油), (Flatoril; Almirall), 西班牙, 胶囊0.5mg+200mg。一种止吐剂和硅油的复合剂, 用于治疗胃积气性消化不良和过敏性结肠炎。副作用有嗜睡和短暂性乳房紧张。孕妇禁用。

氧异安定, Clobazam (Odipam; Kr-

ka), 南斯拉夫, 片剂, 10mg, 20mg。苯并二氮杂草类, 具有抗焦虑和抗惊厥活性, 适用于原发性和继发性焦虑、心理状态紊乱、癫痫和戒酒反应, 禁忌症、注意点和副作用同其他苯并二氮杂草类。

氯哌丁, Cloperastine (Sekisan; Farmasimes), 西班牙, 包衣片10mg, 糖浆剂 2 mg/ml, 抗组胺药和镇咳剂。禁用过敏患者和孕妇、哺乳妇、可发生抗胆碱能反应。用于严重机械损伤的患者时其效力下降。

氯替安定, Clotiazepam (Tienor; Farmaka), 意大利。(Rizen; Puropharma), 片剂 5 mg, 10mg。苯并二氮杂草类, 适用于情绪紊乱、病理性焦虑和神经性失眠, 过敏和重症肌无力患者禁用。副作用和注意点同其他苯并二氮杂草类。

胺苯环庚烯, Cyclobenzaprine (Miorilan; Sigma-tau), 意大利, 片剂10mg。肌肉松弛剂, 适用于痉挛性肌肉综合症的症控制, 禁用于过敏、心肌梗塞、节律障碍、AV阻断、传导综合症、心肌代偿失调和甲状腺机能亢进的患者, 具尿潴留或青光眼的患者在治疗中须注意。用于外科手术患者时其效力下降。对孕妇、哺乳妇和15岁以下儿童的安全性尚未确定, 所报道的副作用有神经反应、心血管和胃肠道功能紊乱, 本药能加强乙醇、巴比妥类和其他精神药物的作用。

泼尼缩松, Desonide (Sterax; Alcon-Couvieur), 卢森堡, 软膏剂, 0.1%。皮质酮类软膏, 适用于变态性、炎症性和瘙痒性皮炎, 禁忌症、副作用和注意点同其他皮质酮类药。

硫氮草酮, Diltiazem (Tildiem; Lorex), 英国, 片剂60mg, (Cardizem; Marion Laboratories), 新西兰, 片剂 30mg, 60mg。钙离子拮抗剂, 适用于心绞痛的治疗和预防。孕妇、具恶性窦综合症的患者, 二期或三期AV阻断和心动过缓的患

者禁用。具轻微心动延缓或PR期延长的患者在治疗前须谨慎。副作用有心动过缓、一期心脏阻断, 尤其是具先天性窦房结疾病的患者。

二甲吡苊+新福林+新霉素, Dimetindene + Phenylephrine + Neomycin (Vibrocil; Zyma), 卢森堡, 凝胶0.025% + 0.25% + 0.245%。局部制剂, 适用于普通感冒、鼻炎和鼻部手术的症状减缓。

二甲噻庚英, Dosulepin (Protia<sup>2</sup>den; Formenti), 意大利, 包衣片75mg, 150mg, 三环类抗抑郁药, 禁用于过敏、青光眼患者, 前列腺肥大和重症肌无力患者, 禁用于孕妇和幼儿其他禁忌症包括严重肝功能不全、近期心肌梗塞患者。不适宜与精神药物和乙醇合用, 其他副作用包括抗胆碱能作用——口干、便秘, 适应性差和眩晕以及头痛、震颤、运动共济失调和变态反应。

表柔红霉素, Epirubicin (Farmirubicin; Farmitalia-Carlo Erba), 西德, 粉针剂10mg, 50mg/安瓿。细胞抑制性蒽环衍生物, 适用于乳腺癌、卵巢癌、胃癌和直肠癌, 亦可用于非何杰金氏淋巴瘤和软组织肉瘤, 孕妇、哺乳妇、骨髓抑制患者或心血管疾病患者禁用, 在治疗期间和停药后三个月中必须采取避孕措施, 副作用同其他细胞抑制剂。

乙柳酰胺, Ethenzamide (Trancalgy<sup>1</sup>-500; Lab Innotech International), 卢森堡, 片剂500mg。水杨酰胺衍生物, 具有镇痛、消炎和解热活性, 适用于偏头痛、牙神经痛、关节痛、腰痛、斜颈和感染性发热症。

羟乙磷酸, Etidronic Acid (Diphon; procter and Gamble), 西德, 片剂 200 mg。二磷酸盐, 适用于佩吉特氏病和其他各种代谢性骨病变的治疗, 在治疗初期可使骨痛加剧, 对含钙离子食物的吸收性减少, 儿童、孕妇、哺乳妇和具严重肾功能障碍或

炎症性肠道疾病的患者禁用。

依托非那酯, Etofenamate (Traumon; Troponwerke), 西德, 凝胶100mg/go非甾体抗炎药, 具止痛作用, 适用于由损伤和慢性风湿病引起的疼痛, 过敏患者禁用, 对孕妇, 哺乳妇以及幼儿的安全性尚未建立。

鬼白乙叉苷, Etoposide (Vepesid; Bristol-Myers), 西班牙, 胶囊100mg。(Etopol; Krka), 南斯拉夫, 注射液20mg/ml; 5ml安瓿, 胶囊剂100mg。细胞毒素, 在南斯拉夫用于急性非成淋巴细胞性白血病, 微细胞支气管和肺癌、何杰金氏病、恶性淋巴瘤、急性成淋巴细胞性白血病和睾丸癌; 在西班牙用于少细胞肺癌、非何杰金氏淋巴瘤和急性骨髓性白血病。禁用于过敏患者、具造血系统疾病的患者以及具严重肝功能不全的患者, 在治疗过程中应使骨髓得到再生的机会。

依曲替酯, Etretinate (Tigason; Roche), 西班牙, 胶囊10mg, 25mg。维生素A类似物, 适用于其他治疗无效的牛皮癣、先天角化过度症、Davies' s疾病、糠疹和其他角化症, 由于本品有致畸性, 故禁用于育龄妇。在治疗前和停药后一年中必须采取有效的避孕措施。在治疗中应监护肝功能, 与苯妥英可发生竞争性结合。

非诺特罗, Fenoterol (Partusisten; Boehringer Ingelheim), 澳大利亚, 粉针剂0.5mg/安瓿。β-肾上腺素能受体阻断剂, 作为子宫松弛剂适于孕期在最后四周内的孕妇的先兆流产、子宫颈功能不良和刮宫术, 禁用于严重阴道流血和子宫内感染的患者, 副作用和禁忌症同其他同类药。

Fosfosal (Disdolen; Uriach), 西班牙, 胶囊, 1.2g。水杨酸衍生物, 具镇痛作用。适用于疼痛的症状缓解。过敏患者和孕妇禁用, 具胃肠道出血症的患者在治疗中须谨慎。

三硝酸甘油, Glyceryl Trinitrate (Transiderm-Nitro; Ciba), 荷兰, 浸透硬膏剂, 25mg, 50mg。三硝酸甘油的局部用制剂, 经皮肤缓慢持续吸收。

愈创甲柳, Guaiamesal (Bronte-

ril; Zambelletti), 意大利, 胶囊500mg, 糖浆剂350mg/ml, 1g/ml, 颗粒剂200mg、500mg/包, 栓剂500mg, 1g。非甾体类抗炎, 解热和镇痛药, 具粘液溶解作用, 适用于急性和慢性呼吸道感染。禁用于胃溃疡、出血素质和乙酰水杨酸过敏的患者。孕妇或具气喘或痛风的患者须慎用。副作用有胃肠道反应、过敏反应、前庭障碍和出血现象。

Guargum (Glucotard; MCP Pharmaceuticals), 英国, 片剂5g。来源于植物纤维的大分子物质, 适用于必须降低餐后血糖浓度时的糖尿病, 必须在治疗中尤其是在治疗的初始阶段监测血和/或尿糖浓度, 副作用与其大分子有关, 有恶心、食欲不振, 情绪亢进, 食道梗阻者须慎用。

卤美松, Halometasone (Sicorten; Ciba), 新西兰, 乳膏0.05%, 软膏0.05%。强效皮质类固醇, 适用于对其他治疗无效的皮肤病, 禁用于病毒和微生物感染、溃疡性皮肤病, 幼年跖肌皮肤病、痤疮、皮肤萎缩和过敏患者。禁止在孕妇的大面积皮肤表面涂擦, 已报道的副作用有营养不良性皮肤反应。

哮平灵, Hexoprenaline (Gynipral; Alkaloid), 南斯拉夫, 瑞士, 注射液0.1mg/4ml安瓿, 片剂0.5mg。选择性β-肾上腺素能受体兴奋剂, 适用于妇科调经期和分娩时或剖腹术前子宫过度紧张的暂时抑制, 禁用于怀孕26周后的孕妇, 严重阴道出血患者, 胎盘过早分离患者以及具有心动过速、低血压、心肌炎或甲状腺毒症的患者。有冠心病的患者须慎用。副作用有心动过速, 胃肠道障碍、胸痛和呼吸困难。

透明质酸, Hyaluronic acid (Pandermin cicatrizante; Vinas), 西班牙, 浸润的纱布, 0.02mg/cm<sup>2</sup>。局部制剂, 适用于皮下创伤的加速愈合和减少渗液。患有性病和结核性损害的患者禁用。

[ Drug Information 《药物情报》, July - September: 16~28, 1984 (英文) ]

朱为敏译 郑绳一校