

发了绞股兰系列产品，如绞股兰精、绞股兰茶、绞股兰“古兰可乐”、绞股兰晶、绞股兰蜂王浆等产品。日本近来也推出了以绞股兰为主要原料的“长命酒”。

△中医药临床疗效已达新水平 从7月16日在上海开幕的我国首次举办的中医药国际学术会议获悉，我国中医药的临床疗效已达到一个新的水平。如应用“化痰通腑法”治疗急性缺血脑卒中，“益气活血合剂”为主治疗急性心肌梗塞，其疗效已达到国内外先进水平；用“化淤尿石汤”治疗肾、输尿管结石，用“温肾利尿法”治疗输尿管结石嵌顿性肾积水症；用“胃金丹”治疗慢性胃炎；用“大菟丝子饮”治疗再障等均达到良好的功效；用中医中药对肺癌、胃癌、肝癌和大肠癌的治疗，其疗效也优于单纯用西药的治疗。用“肝血宝”、“冬虫夏草胶囊”、“益气煎”等对肿瘤化疗病人白细胞减少、免疫功能衰退进行治疗显示良好的升提效应。

△生精散治疗男性不育 遵义市男性不育研究所医师晋超文以中草药制成“生精散”，疗效显著，治疗男性不育总有效率达96.4%，1000例男性患者中，经治愈后

有303例的妻子已怀孕，其中102人已生小孩。该研究已通过省级鉴定，据认为这项成果已达国内外先进水平。

△补气通腠饮加味治疗产后尿潴留 江苏省东台县人民医院、中医院用补气通腠饮治疗30例产后尿潴留，效果显著。治疗方法：均服补气通腠加味方（炙黄芪、党参、麦冬、车前子、冬葵子、茯苓、泽泻、王不留行、制升麻、炒枳壳、通草）。每日1剂，水煎服，早晚各服1次。兼湿热者加炒知柏各10克，上肉桂1~2克（后下），或加金银花15克；淤血阻滞胞宫者加琥珀粉3~5克（冲服）。

△雷公藤治疗播散性神经性皮炎 福建省皮肤病防治研究所应用雷公藤治疗播散性神经性皮炎37例，取得良好效果。治疗方法：采用建宁县产药用雷公藤，剂量为每日25克，一剂两煎，每煎半小时，分两次服。7天为一疗程。治疗期间不加外用及其他口服药。结果痊愈3例，显效23例，有效6例，无效5例。多数病人在服药后第三天，其皮肤瘙痒程度即明显减轻，皮疹脱屑变薄。服药期间很少发生副作用。

国内外药物简讯 (1987年3季度)

△美国纽约州立大学的化学教授埃·布洛克发现，大蒜含有一种有抗凝作用的化合物(Ajoene)、它对治疗心脏病、循环系统病、动脉硬化、中风以及血淤等都有不同程度的疗效。不过要把这种化合物提炼出来作为一种药物使用，尚需经过严格的检验。

(药信)

△酮康唑是一种抑制卵圆形马拉色氏菌生长繁殖的有效药物。曾有报道口服酮康唑治疗头部银屑病和脂溢性皮炎有效，但时而有不良反应发生。作者给37名脂溢性皮炎患者局部应用2%酮康唑乳剂和安慰剂乳剂进行双盲法试验研究，观察患者头皮鳞屑中卵形马拉色氏菌的数目、形态变化和临床效果。结果2%酮康唑乳剂使头部活菌数目明显减少，其临床效果优良，治愈率占95%；安慰剂乳剂仅使一例患者好转，其余使用者

均无效。(药信)

△美国几位学者报道，肾上腺素可降低血透析患者的血钾浓度。随后本文作者用此药治疗三例危重患者。一是严重烧伤(面积90%)心跳复苏者，静滴肾上腺素20微克/分，10分钟后血钾浓度(mEq/l,下同)从8.5降为6.7。另一位是冠状动脉手术患者，发生无尿而进行血透析。静滴肾上腺素2微克/分，5分钟后血钾由6.7降至4.9。其三是主动脉瓣置换术病人。静滴肾上腺素13微克/分，30分钟后血钾自7.0降到6.4。

(药信)

△众所周知，扑热息痛是一种较为安全的常用解热镇痛药，但长期大剂量服用也产生肝积蓄中毒。对于患有慢性肝炎或其他肝功能不全的人来说使用扑热息痛往往会加重病情。去年美国斯特灵——温特洛普制药公

司对扑热息痛肝毒性这一缺点，研制成功一种新型的扑热息痛合剂(商品名Pameton)。此药系扑热息痛和蛋氨酸复合而成，后者系一种人体必须氨基酸，不但保护肝脏，还能补益人体，Pameton的问世扩大了扑热息痛的使用范围。(药信)

△甘露醇快速静滴治疗坐骨神经痛，根据是该病的神经及其周围组织受压微循环失调、水肿等。20%甘露醇为高渗溶液，能使血浆渗透压增高，故有使组织脱水作用，使受压组织脱水与颅内压力降低及局部组织缺氧状态改善而达到治疗目的。该方法正在解放军157医院内一科临床进一步验证与理论探讨。(药信)

△异搏定是一种钙内流阻滞剂，治疗隐匿性抑郁症作用类似于锂盐。已证明锂盐治疗隐匿性抑郁症是有效的，而常规的安定类镇静剂却无效。对20名男性、年龄25~50岁病人，采用双盲法进行了研究，病人接受30天异搏定治疗试验，每次80mg，每日4次，通过单独服用安慰剂10天后，再服氟哌啶醇更有效，研究者认为，异搏定治疗以抑郁症显著的精神分裂症可能特别有效。(药信)

△美国雷安头痛病研究中心的专家们报道，β受体阻滞剂与阿司匹林合用于偏头痛的治疗，可获良好效果。常用的β受体阻滞剂是心得安或蔡羟心安。在接受治疗的48名偏头痛患者中，服用心得安每天20~40毫克、阿司匹林650毫克以后，有36名患者的头痛程度和持续时间明显好转，另外6名略有好转。据认为心得安治疗偏头痛的有效不是β受体的阻断作用，而是与抑制血小板聚集和释放5-羟色胺有关。又36名头痛患者使用了蔡羟心安和阿司匹林，前者的剂量是每天40毫克，疗程4个月，总有效率为53%，疗效较差的病人可将剂量加倍，则疗效明显提高，而且没有明显的副作用。β受体阻滞剂加阿司匹林治疗偏头痛是一个可喜的开端，而单用阿斯匹林是无效的。(药信)

△据报道日本花皂业公司推出一种用于便后擦拭肛门周围的清洁保护剂。该品由角鲨醇、甘油三酯及消炎药组成，制成与皮肤亲和性较好的低粘度油状物质。充填于喷雾器内，用时直接喷洒在卫生纸上具有较好的清洁、保护消炎功效。可供痔疮患者大便后擦拭肛周。经试用可使痔疮症状明显好转，大便后脱出肛门的痔核易于回纳，还可减轻肛周皮肤搔痒，小几肛周皮肤糜烂尤为适用。(药信)

△鼻咽癌患者经放射治疗后，常引起放射性根尖周围炎，不久牙齿松动、脱落。福

建中医学院附属人民医院邓治国同志采用当归、杜仲、骨碎补、大黄、石膏等中药加食盐适量研磨成粉末，过100目筛制成散剂。治疗方法：患者于清晨起床和晚上临睡前用棉签蘸药粉涂擦牙龈，每次3~5分钟，半个月为一疗程。(药信)

△近期国际皮肤病杂志报道，用甲氰咪胍治疗女性雄激素原性脱发取得良好效果。研究者对10例病期在2~13年女性雄激素原性脱发患者，用甲氰咪胍300mg，1日5次进行治疗，治疗期为1.5~9月(平均5月)。结果，10例中7例毛发再生(用药后10~18周开始生发)。3例痤疮、脂溢患者也明显改善，大部分患者感到头皮油腻减少。研究者认为甲氰咪胍治疗女性雄激素原性脱发，可能与其阻止二氢睾酮和雄激素受体结合从而阻断雄激素作用相关。尽管这种治疗胃溃疡的药物并非为治疗脱发的首选药，但对女性雄激素原性脱发是有效的。(药信)

△北京现代中医临床免疫研究所新近推出一种由36种中草药精煉而成的戒烟香水，经有关医院100例检查，其有效率为98%，被誉为“神奇戒烟灵”。戒烟者只要每日吸嗅这种戒烟香水10~20分钟，连续三天，吸烟欲望即可急剧下降并讨厌抽烟。嗅后无任何不良反应，对人体无毒无害。(药信)

△目前在日本出现了“药茶热”，用人参、首乌等补药制成的高级药茶畅销外，金银花、白菊花、木槿花、金钱草、夏枯草、薄荷等中草药制成的药茶也十分畅销。饮用药茶的人日益增多。日本进口商要求我国多生产药茶。(药信)

△西德柯西特股份有限公司研究制出一种商品名为“贝西因”的抗前列腺癌的新型鼻喷剂。由于鼻喷剂不经过消化道和胃肠，避免了酶对药物的分解，药物经鼻粘膜直接进入血液，可以有效地阻止前列腺肿瘤的发展。经临床使用表明，用药后有39%的患者有明显地好转，肿瘤细胞不再增长并逐渐消失。(药信)

△日本富山医科大学药理学教授森田直贤，利用老鼠进行了三年实验，从茶叶中提取多糖类物质注射到患有糖尿病轻重不同程度的老鼠体内。所用剂量是每公斤体重注射500mg，经数小时，老鼠的血糖均恢复到正常水平，证明茶叶中的多糖物质可以除去血液中过多的糖分，具有防治糖尿病的作用。绿茶所含的物质比红茶的多，绿茶一般为31.7%，红茶只为19.4%，同一种茶叶中，粗茶的含量又比精制茶的多。(药信)

景凡伟