

(每1 ml的0.1 mol/L NaNO<sub>2</sub>液相当于16.52 mg的C<sub>9</sub>H<sub>11</sub>O<sub>2</sub>N)。

4. 抑菌试验: 对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等本品溶液或稀释液(1.5%)均能杀菌。

### 三、用法

烧、烫伤部位经清洁消毒处理后,用无菌棉签蘸取虎杖烧伤涂膜剂,涂布于烧烫伤

创面,每日涂3~4次,至形成胶痂不再涂药。如有胶痂破裂之处或未形成胶痂的地方要继续涂药至形成完整胶痂为止。

### 四、小结

虎杖烧伤涂膜剂是根据膜剂原理制备的,经临床验证使用多年证明效果理想,作用可靠,治愈率较高,制备和质量控制方法简单适,合中小医院制备。

## · 产品介绍 ·

# 注 射 用 蝮 蛇 抗 栓 酶

Ahalsantifarctasum Pro Iniectione

**【作用与用途】** 本品是从陆生蝮蛇毒中提取的一种酶制剂。临床应用时曾名为“清栓酶”。对血液粘度、血浆中纤维蛋白原、血脂具有明显降低作用。尤其对血小板数量、粘附与聚集功能有明显下降作用。本品主要适用于急性脑血栓、脑血栓恢复期、血栓闭塞性脉管炎、大动脉炎、深部静脉炎、雷诺氏病等周围血管病及断肢(指)再植中抗凝等。

**【用法与用量】** 每日1~2支,极量3支,用生理盐水或5%葡萄糖注射液250毫升稀释后静脉滴注。控制滴速以每分钟40滴为宜。每次按0.005~0.012单位/公斤计算(成人一般0.25~0.5单位,极量0.75单位)。

**【规格】** 每支含0.25酶活力单位。

### 【注意事项】

1. 本品系蛋白质酶类制剂,用药前需用生理盐水稀释,用0.002单位/1毫升浓度,取0.1毫升做皮试,15分钟观察,红晕直径不超过1厘米或伪足三个以下者为阴性后,

方可使用。用药过程中注意过敏反应,遇有过敏反应时,应给脱敏药物治疗。

2. 用药过程中出现患肢胀麻、酸痛感、头痛、或患偏头痛、周身发热、出汗、多眠等症状,是感觉与运动恢复先兆,不用处理,可自行缓解。

3. 本品系生物制品,在治疗过程中必须在医生指导下进行定期(每周1~2次)检查血小板功能及纤维蛋白原等改变。结合临床症状及体征恢复情况继续用药或停药。

4. 一个疗程时间2~3周,按临床用量给药比较安全。

5. 女性月经期慎用。

**【禁忌症】** 出现凝血机制障碍、低纤维蛋白血症、脑出血或有出血倾向、活动性肺结核、活动性溃疡病、严重肝、肾功能不全者禁用。

**【有效期】** 暂定二年。

**【贮藏】** 室温避光保存。

**【生产单位】** 浙江仙居制药厂。