

查,脾脏柔软。4例病人全部治愈。随访6~8个月,未见复发。

处方:桑叶120g、菊花80g、川贝10g、阿胶10g、生地10g、三七9g、鳖甲15g、蜂蜜15ml。水煎服,一日一剂,分2次空腹服。

典型病例

杜××,女,54岁,农民。1987年9月2日来诊。主诉:半年来腹胀、腹痛、恶心、食欲差、倦怠乏力,小便不利且少,大便溏薄,夜不能卧,劳动能力丧失。气急、心慌。62年曾患肝炎。查体:皮肤粗糙,下肢浮肿,腹部肿胀明显。右上腹疼痛拒按,肝下缘位肋下约5cm,触之坚硬不移。生化检验黄疸指数5、TTT3、TFT阴性、GPT27、VDB直接及间接检验阴性,“B超”检查显示肝、脾增大、肝内回声不均质,肝内管腔系统粗大不均,门静脉清晰可见约1.2cm,胆囊壁厚毛糙,腹腔可见液性暗区。诊断:肝硬化、腹水、脾大。

治疗:服用益肝饮3剂后,气急、心慌缓解,腹胀、腹痛、恶心、乏力等症状消失,小便增加,食欲大增。触诊脾脏缩小,肝脏较治疗前柔软,回缩至肋下1.5cm。随访8个月未复发,劳动能力恢复。“B超”检查肝脏形态正常,肝内回声均质,胆囊大小正常,脾厚4cm。痊愈。

讨论

肝硬化腹水症祖国医学认为水、湿、热、阻是本症之症结,故本方施以润肺利水、疏肝解郁、理气之法,辅以化淤清热、软坚、补益之品而奏效。方中桑叶、菊花归肺肝二经,取其益肺利水,疏肝解毒之功,为方中主药。以三七归肝经活血化淤止痛之效;川贝、阿胶润肺滋肝阴与三七共为桑菊之辅药;鳖甲、生地软坚散结清热滋阴,蜂蜜滋补脾肺共为佐使药。诸药相合使肺气健而水道得通,络脉得畅,淤血得化。脾湿去而得健运,使水邪除,诸症自缓,各脏功能恢复而收功。

自制逍遥丸治疗乳腺病的研究

解放军230医院 陈明捷 苏景福 邱坤 陈丙文 肖亦南 荷艳丽

乳腺囊性增生病(简称乳腺病)是指乳腺小叶和乳腺导管结缔组织增生以及乳管扩张或成囊形肿,属于中医“乳癖”范围,系常见多发病。大约20%可发生恶变,有人将其视为乳癌前期病变,尚缺乏有效的治疗方法,我们自1975~1988年间共门诊治疗526例,效果满意。

一、药物组成:柴胡、当归、炒白术、茯苓、白芍、甘草、薄荷等。将上述药品混匀、粉碎过100目筛后,炼蜜为丸,每丸重9克。

二、辨证施治:本病属肝气郁结,乳络

阻滞,本方能活血化淤、疏肝散结、祛淤止痛。

三、服用方法及用量:每日3次,每次1丸,30天为一疗程,需3~6个疗程。一年后观察评定疗效。40岁以上者于月经前5~7天每天肌注丙酸睾丸酮25毫克,连用3~5天。

四、临床资料

本组526例,年龄17~55岁,平均44.5岁,其中30~40岁274例,占52.09%;已婚418例占79.46%;治疗前月经基本正常518例,占98.48%。病程为7天至10年不等,以

3个月至1年者为最多,有510例,占96.96%;526例中有乳房肿胀痛者408例,占77.57%;经前期或经期疼痛增剧者389例,占有乳房疼痛408例的95.34%;乳腺肿块最小者约 0.5×1.0 cm,最大者 4×5 cm,本组526例中经活组织检查证实257例占48.486%,乳房软射线拍片259例占49.24%,其余则根据病史和体征做出诊断。

五、诊断依据

本文526例均为外科门诊检查确诊。确诊依据:①月经来潮前乳房胀痛加剧;②乳房内有两个以上大小不等圆形或扁平状质韧的结节,触痛明显;③结节可以移动,与周围组织分界不清,与皮肤及胸大肌筋膜无粘连;④肿块大小随经期有明显变化;⑤局部皮肤无红肿,腋下淋巴结无肿大。

六、疗效标准

治愈:乳房肿痛明显消失,肿块消失或变软,有显著缩小。

无效:疼痛无减轻,肿块无改变,526例的治疗结果:治愈402例占76.42%;好转113例占21.48%;无效11例占2.09%。

七、体会

1. 我们认为逍遥丸治疗乳腺病疗效确切,治愈率高且少复发,无毒副作用,患者大都按疗程服用。

2. 逍遥丸有活血化淤、增强免疫、疏通经络和调节内分泌之功效,所以本方不但可治愈乳腺病而且可用于乳腺病恶变的治疗和预防(根据文献报道,乳腺囊性增生病约20%可发生恶变)。因此对本病患者应重视随诊,如肿块再出现、增大或变硬者应警惕恶变的可能。

复方甲硝哒唑乳霜剂治疗疥疮50例

解放军第254医院 任笑传

疥疮是具有传染性的一种皮肤病,近年来发病率较高。过去多用六氯化苯的 γ 异构体治疗疥疮,但是此药物半数致死量非常小,毒性大并有药物所致的变态反应。在1981年的国际致癌物第二届年度会议上被列为致癌物质。

我院根据国内外关于甲硝哒唑及氮酮的报道,翻阅文献,于1989年初,以氮酮为高效透皮吸收促进剂,配制了复方甲硝哒唑乳霜剂,经过临床上给予50例患者使用,得到了良好的效果。现将配制和临床观察结果介绍如下。

(1)处方:甲硝哒唑5g 三乙醇胺 20g
洗必泰 5g 甘油 50g
氮 酮 3g 尼泊金乙酯 1g

硬酯酸 150g 蒸馏水 500ml
羊毛脂 20g
凡士林 250g

(2) 配制工艺:根据处方称取硬酯酸、羊毛脂、凡士林、氮酮混合共溶于 70°C 取下,另取三乙醇胺、甘油、尼泊金乙酯、甲硝哒唑、洗必泰、蒸馏水混合共溶于 70°C 取下。两相混合搅拌成乳霜剂,分装成品用于临床。

(3) 治疗方法、涂抹于患处及全身,每日2次。

(4) 临床观察:50例复方甲硝哒唑乳霜临床观察情况见下表。

讨 论

(1) 疥疮主要是由于人型疥螨所致,