

## 连续肌注庆大霉素慢性过敏1例报告

解放军第230医院 张艳玲 段纯厚 叶凤山

患者周××,女,34岁,于88年11月2日16时因接触性出血一年,入院检查治疗,经诊断为宫颈管肿物、阴道炎。在11月6日上午施宫颈管肿物切除术。术后注射庆大霉素8万单位,8小时一次,肌注。术后第五天下午16时,病人肌注庆大霉素8万单位,半小时后,自感胸闷,周身发痒,给予口服扑尔敏片8mg后,症状消失。半夜12时再次肌注庆大霉素8万单位,半小时后,病人突感头昏胸闷,呼吸困难,全身发冷,发痒。体查:神志清楚,脉搏慢而无力,60次/分;呼吸急促,34次/分;血压110/70mmHg,体温37.6℃;头面颈部皮肤潮红,手指末端发绀,全身及四肢有散在片状荨麻疹,两肺有干鸣音。既往体康,无药物过敏史。诊断:庆大霉素慢性过敏。处理:立即给予

吸氧、10%葡萄糖20ml、维生素C1g、地塞米松5mg静注。1小时后症状有所好转,呼吸平稳、脉搏有力;5小时后,皮肤颜色恢复正常,散在的片状荨麻疹消失,手指末端正常。次日因病情好转出院。

讨论:庆大霉素属氨基糖甙类抗生素,在临床上应用甚广,因不用做过敏试验,所以往往忽视过敏反应,因此应用前要仔细询问患者有否过敏史。对有过敏体质的病人或有药物过敏史者用更应慎重。因此我们主张做过敏试验较安全。

过敏试验液配制:每ml含庆大霉素100单位。即4万单位一支的庆大霉素加注射用水400ml配成。用时皮内注射0.1ml20分钟看结果,无阳性反应者方可给药。

## 甲硝唑引起严重过敏反应一例

解放军第222医院 王延伟 王焱 阎桂华

甲硝唑常用于治疗阴道滴虫病,胃、十二指肠溃疡以及牙痛止痛等,很少引起严重过敏反应。我院妇产科收治一例外阴瘙痒患者,在用甲硝唑治疗后,引起全身过敏反应,现报告如下。

患者女,51岁,因外阴瘙痒、白带增多来我院门诊诊断为“滴虫性阴道炎”。即以甲硝唑200mg,每日三次口服治疗。用药第三天,患者突然出现全身浮肿,双乳胀痛,以颜面部及双乳明显,伴有呕吐、胸闷、气

短等症状。随后住院、查体:体温、脉搏、血压属正常,呼吸24次/分,营养状况佳,心肺正常,既往无过敏史。实验室检查:白细胞 $10.8 \times 10^9/L$ 、分叶79%、酸性2%、淋巴18%、红细胞 $4.1 \times 10^{12}/L$ 、血色素121g/L、血清尿素氮5.4mmol/L、肌酐 $86.6 \mu\text{mol}/L$ 、尿pH6.0、蛋白 $\phi$ 。停药后,给予抗过敏治疗:10%葡萄糖酸钙10ml静注,每日三次,扑尔敏8mg、双氢克尿塞25mg,10%氯化钾10ml,每日三次口服。