

药。另外有防晒护肤霜等已应用于临床，疗
效很好。所有这些工作目的也就是更好地利
用药学情报，充分为临床服务。

246张书写不合格处方分析

解放军第413医院(浙江舟山 316000) 王雁霞 张海琪

处方管理是药品使用管理的重要环节，
旨在正确发挥药品的作用，防止医疗事故和
药品浪费，确保病人用药安全、有效。处方
书写质量不高，就会给调剂工作增加困难，容

易发生差错，直接影响病人的用药。

笔者抽查了本院的 3915 张普通处方，从
中查出书写不合格处方 246 张，现采用“因果
分析图”分析如下(图 1)：




图 1 处方书写不合格的因果分析图

从上图看出，导致处方书写不合格的因素共有 21 种，其中属正文书写不合格的因素占多数(15/21)。

在查出的 246 张不合格处方中，正文书
写不合格有 226 张，占总数的 91.9%。现再
用“主次因素图(pareto 图)”分析这 226 张不

合格处方(图 2)




图 2 处方正文书写不合格主次因素图

图中显示,用法不明确和剂型差错二项累计百分数达79.2%,可以判定用法不明确和剂型差错是A类因素(主要因素)。所以,减

少不合格处方的关键是正确书写药品的剂型和用法,只要克服这两个主要问题,就可大量减少不合格处方,为此,医药人员要共同努力,做好以下事项:

1. 临床医生要熟练掌握“处方书写质量合格标准,严格按照标准书写处方。
2. 临床医生要熟悉药品的剂型、规格及用法,特别是不常用的药品和新药。做到勤查勤问。
3. 在处方书写用法不明确中,大部分错误发生在外用药和五官科用药。如外用药在用法中只写“外用”二字,而未写明给药途径、部位、次数和剂量。对此,临床医生应特别加以注意。
4. 药剂人员要主动与临床医生联系,及时反馈处方中存在的问题,通报最新的药品信息,严格把关,对不合格处方一律退回。
5. 药局要组织人员定期抽查处方,找出主要问题,并采取相应的措施予以解决,不断提高处方书写的质量。

美国药师总数超过 19 万人

李健 译 张紫洞 校

根据美国药学会等许多全国性药学机构的协作所进行的一项全国性研究结果表明,截至 1992 年 12 月 31 日为止,全美 50 个州和首都华盛顿特区正式向政府登记注册的药师总数已达 194540 人,他(她)们都正在服务或开展业务中。

此项“药学人力资源调研计划”确证全部注册药师的数字概况如下:

1. 男性药师为 64.6%, 女性药师为 29.1%(另有 6.3% 未详)。
2. 药师中 86.2% 具有药理学学士学位;

4% 具有药理学博士学位, 1.6% 具有药理学学士和药理学博士学位; 0.1% 具有药理学博士和另一种学位; 0.1% 具有药理学学士、药理学博士和另一种学位; 1.5% 具有其他的混合学位。

3. 药师中 82.6% 是白种人; 2.4% 为黑种人; 1.4% 为西班牙后裔; 2.8% 为亚洲或太平洋岛屿人; 0.4% 为美国印第安人或土生的阿拉斯加州人; 其它 10.3% 未详。

4. 按照医药机构区分: 33.1% 为独立经营药房的公共药师; 32.8% 为链式药房的药