

多虑平引起震颤麻痹征群一例报告

陈祥忠 陈龙英

(解放军 303 医院神经内科 南宁 530021)

患者男性,45 岁。病案号 119760,于 1993 年 11 月 4 号入院。患者自 10 年前开始,无任何原因反复出现头昏、失眠、多梦。住院前 1 月上述症状加重伴记忆力下降,精神不集中,对任何事情都不感兴趣。查体:一般情况尚可,神清合作,表情淡漠,颅神经(一),心肺听诊无异常,腹部检查无特殊,神经系统未发现阳性体征。既往史无特殊,肝肾功能检查均正常。住院诊断:神经症;后应用多虑平片 50mg 3/日,服药第 3 天,病人出现四肢不自主抖动,面具脸,语言缓慢,慌张步态,动作迟缓,双手静止性震颤,肌张力增高呈齿轮

样,双侧腱反射亢进,掌颌反射阳性,双侧巴氏征(+),奥本汉氏征(+)。估计服多虑平所致,停用此药后症状逐渐消失。

讨论:多虑平是一种副作用极少的抗忧郁病药。对抑郁症特别是焦虑性抑郁症效果良好。多虑平能阻断多巴胺神经受体或耗竭锥体外系多巴胺贮存,导致乙酰胆碱系统的功能相对增强,引起以肌张力增高及运动障碍为主要表现的锥体外系症状,特别是对药物高敏患者更易出现。在出现毒性反应后,应立即停药,无需特殊处理,在较短时间内临床症状即可消失。

转移因子致大疱性表皮松解坏死型药疹死亡一例

杨素兰 王君松

(济南军区第 88 医院 泰安 271000)

患者×××,女,67 岁,因全身皮肤红斑水疱伴发烧 3d,于 1994 年 3 月 22 日住院诊治。病人于该月 19 日注射 1 支转移因子(山东省生物制品研究所,批号 931002)。次日下午发现前胸散发粟粒到指顶大丘疹、红斑。皮疹迅速增多扩大,部分皮疹融合成斑片,且面部已出松弛性水疱,破溃,渗液,体温 38℃以上,服息斯敏无效。门诊以大疱性表皮松解萎缩坏死型药疹入院治疗。

病人既往有风湿性心脏病 10 余年,伴二尖瓣狭窄及闭锁不全、心房颤动。多发性脑梗塞,偏瘫失语 8 年。1993 年 4 月因小肠坏死,

进行肠切除。近期末用其他药物。

体检 T38℃,P120 次/min R40 次/min, BP12.0/8.5kpa,急性重病容,昏睡状态。听诊双肺呼吸音粗,可闻及哮鸣音;心率 122 次/min,心律绝对不齐。心尖可闻及Ⅲ—Ⅳ级收缩期杂音;主动脉听诊区可闻及Ⅲ级收缩期杂音;肝、脾肋下未触及;右上、下肢偏瘫,右巴氏征阳性,皮肤科情况:全身皮肤密布粟粒到指顶大丘疹,红斑,多呈暗红色,以躯干及面部尤甚,有的红斑中央有小疱,面部有松弛性大疱、破溃、渗液,四肢皮疹间有正常皮肤,尼氏征阳性,鼻、口腔、眼粘膜均有糜