

· 药物不良反应 ·

核糖霉素致脱发 1 例报告

卢慧勤 王红梅

(解放军第 177 医院 广州 510310)

核糖霉素(Ribostamycin)是由 Streptomyces Ribosidificus 所产生的一种氨基糖甙类抗生素。临床上主要用于葡萄球菌、肺炎杆菌、变形杆菌所致的呼吸道感染、尿路感染等。本品毒性较低,尤其是对听觉和肾脏的毒性均较小^[1],偶有耳鸣,麻木,头痛,胸闷等^[2]。但引起脱发的报道国内未见。笔者遇见 1 例,现报道如下。

患儿,卢某,女,5 岁,因发热、咳嗽、咽痛于 1992 年 5 月 13 日来我院门诊就诊,诊断为上呼吸道感染。给予核糖霉素(广东蛇滨制药厂。日本明治制果株式会社监制,批号 920304) 0.25g, bid, im, 同时加服 Vc 片 0.3g/d, 共给药 4 次。4 日后临床症状消失,但患儿头发从顶部向四周逐渐脱落至全秃(时间是 1992 年 5 月 19 日至 5 月 25 日),停药后 3 月头发又逐渐生长,6 月后恢复原样。该患儿 1993 年 3 月 11 日因患“上感”再次用药,仍给予核糖霉素(同一制药厂,同一批号)

0.25g, bid, im, 共 6 次。3 日后,头发又从顶部开始向四周脱落至全秃,停药后至今仅有少量细疏毛发生长。

讨论 患儿按常规剂量两次肌注核糖霉素均发生脱发现象,停药 3 月后毛发再生,故推测为核糖霉素所致,其机理有待进一步研究。

文献认为,核糖霉素无绝对禁忌症,但 12 岁以前小孩不宜应用^[3]。本例患儿 5 岁,似有用药不当之处。因此,医务人员应重视药物的适用范围,对已发生反应的,应立刻停药,并应避免重复用药。

参考文献

- [1]陈新谦,金有豫. 新编药理学. 第十三版. 北京:人民卫生出版社,1992:80
- [2]徐元贞,金祖芳. 新全实用药物手册. 郑州:河南科技出版社,1991:42
- [3]吴瑞芳,张建藩. 进口医药商品手册. 北京:中国医药科技出版社,1991:69

心得安加异搏定引起严重心律失常 1 例

温宏伟 张力新 富伟

(沈阳军区总医院北陵医院 沈阳 110031)

患者女性,44 岁,因“甲亢性心脏病,多发房性期前收缩”收入当地医院。既往患甲状腺机能亢进症 10 年,慢性肝炎 6 年,甲亢性心脏病 2 年,平素经常自服抗甲状腺药物。入院后内服心得安,每日 3 次,每次 20mg,同时加服异搏定,每日 3 次,每次 80mg,用药第 7

天病情加重,伴胸闷、头晕,心电图:Ⅰ度Ⅰ型房室传导阻滞而急诊入我科。查体:T37.1℃,呼吸稍急促,口唇发绀,BP13.3/8.0kPa,心界略扩大,心率 46 次/min,律齐,偶闻“大炮音”,心尖部闻及Ⅰ级缩鸣,双肺未见异常,心电图:高度房室传导阻滞,超声心