

## ·药物不良反应·

## 去痛片的不良反应

廖纶寿

(江西省兴国县人民医院 兴国 342400)

**摘要** 本文综述了 1982 年至 1995 年国内部分医药文献报道的关于去痛片引起的高血压、贫血、急性溶血、血尿、剥脱性皮炎伴发气胸、急性肝坏死、严重过敏反应等多种不良反应,其中特别有 2 例患者仅服了 1、2 次常用剂量的去痛片而很快死亡。因此在使用该药时,不但要提高警惕和注意,而且随时要有急救的准备。

**关键词** 去痛片;不良反应;过敏反应;依赖性

去痛片(又称索密痛, Somiton)是一古老的解热镇痛药,用于发热、头痛、关节痛、神经痛、痛经等。本文仅就其发生的不良反应综述如下:

### 一、引起严重过敏反应 8 例

刘建波等<sup>[1]</sup>报道他所在医院从 1980~1986 年共收治了 17 例 po 去痛片致严重不良反应病例,其中男 4 女 3,年龄在 5~55a 之间,7 例患者均有恶心、呕吐、皮肤紫癜、血尿、腹痛、柏油状大便、口唇及粘膜发绀,血压均在 10.7/8Kpa 以下,或不能测知。其中 1 例呕血约 500ml 左右。另 1 例 5a,女,因上腹部疼痛,其母用自备去痛片半片于晚 9h 给 po, d2 早晨 7h 其母叫患儿起床时,呼不应,急送入院,查 BP 为 0,急诊胸片未见异常,出现点头呼吸、瞳孔散大、小便失禁,20min 后,呼吸心跳停止而死亡。

梅国华<sup>[2]</sup>报道 1 例患者男, 21a, 因上呼吸道感染服去痛片 1 片, 10min 后全身皮肤发红、瘙痒伴头晕、胸闷, 随后昏倒。检查: 四肢湿冷, 脉搏触不清, BP 8/4Kpa, 心率 124 次/min, 经抢救, 3d 后皮疹消退。

### 二、引起急性肝坏死 1 例

患者女, 39a, 既往无肝炎病史, 入院前 3d 连续 2 次各服去痛片 1 片, 次日周身便出现皮疹和水泡, 并伴有发热、乏力、食欲不振

和精神萎靡。入院后病情迅速加重、昏迷。诊断为: 药物中毒性肝炎急性肝坏死, 大疱表皮松解萎缩性皮炎。经综合抢救治疗无效, 于入院后的 d2 死亡。

### 三、引起高血压 1 例

患者女, 66a, 既往无高血压及肾脏病史, 给予索密痛 1 片, tid, 连服 10d 后突然出现头昏、恶心、呕吐, 测血压为 21.1/13.9Kpa, 停服索密痛, 5d 后 BP 降至 15.7/10.7Kpa, 上述症状及体征消失。再服 BP 又升高, 停服渐恢复正常<sup>[4]</sup>。

### 四、致剥脱性皮炎伴发左侧气胸 1 例

患者男, 41a, po 去痛片 2 片, tid, 以及力维隆糖浆, 连服 3d。停药 1wk 时自觉皮肤瘙痒、灼热, 继而面部水肿, 全身皮肤充血, 出现斑丘疹, 伴发热, 体温达 39.6℃。继之全身泛发红色丘疹, 融合成片。后左侧胸痛、气短, 入院诊断为①肺结核并发自发性气胸, ②药物剥脱性皮炎。经对症综合治疗, 45d 后治愈。乃再次 po 力维隆糖浆, 未见皮疹出现<sup>[5]</sup>。

### 五、引起血尿 2 例

患者男, 30a, po 索密痛 1 片, tid, 次日 2 片/次, tid, d3 出现血尿 3 次。患者女, 28a, 以往无腹痛、肾病史, po 索密痛 1 片, tid, 服药后不久发现血尿, 牙痛 3d, 尿血 2 次<sup>[6]</sup>

### 六、引起急性溶血 1 例

患者女, 12a, 因患感冒服用去痛片 4.5g 后发现小便呈酱油色, 入院查体温 38℃, 严重贫血貌, 皮肤巩膜黄染, 尿液呈酱油色, 尿红胆汁阴性, 尿胆素元阳性。诊断为去痛片致急性溶血。经积极对症治疗后恢复<sup>[7]</sup>。

### 七、致铁粒幼细胞性贫血 1 例

患者女, 54a, 因偏头痛及肩背痛服用去痛片长达 2a, 1 片/次, 2~3 次/d, 服到 1.5a 时开始出现贫血。诊断为: 铁粒幼细胞性贫血(简称 SA), 立即停药, 对症治疗, 35d 后血红蛋白上升至 85g/L, 头晕、心悸、乏力等症状好转, 但 1mo 后病情出现反复, 上述症状再度加重, 血红蛋白降至 75g/L。原因是患者近 1mo 违背医嘱, 再度加服去痛片, 以后终因患者对去痛片形成依赖性, 变为难治性 SA<sup>[8]</sup>。

### 八、致药物免疫性溶血性贫血 1 例

患者女, 16a, 入院当日 po 去痛片 1 片, tid, 4d 后出现腰痛、乏力, 尿呈酱油色或呈浓茶样, 伴头昏、心慌、气短及面色苍白, 再根据体征, 实验室检查等, 高度怀疑是去痛片致急

性自身免疫性溶血性贫血, 经对症治疗 6d 后痊愈出院<sup>[9]</sup>。

### 九、致粒细胞减少 1 例

孙琳等<sup>[10]</sup>报道的药源性粒细胞减少中的其中 1 例是由去痛片引起的。

#### 参考文献

- [1] 刘建波等. 去痛片的严重过敏反应 7 例报告. 中级医刊, 1987; 22(8): 49
- [2] 梅国华. 口服去痛片引起过敏性休克 1 例报告. 临床皮肤科杂志, 1987; 16(5): 275
- [3] 刘振武. 去痛片引起急性肝坏死 1 例. 实用内科杂志, 1989; 9(2): 108
- [4] 马启泉. 口服索密痛引起高血压 1 例. 中华心血管病杂志, 1988; 16(5): 303
- [5] 朱海文. 去痛片致剥脱性皮炎伴发左侧气胸 1 例. 实用内科杂志, 1990; 10(11): 573
- [6] 关育仁. 索密痛引起血尿 2 例. 吉林医学, 1982; 3(3): 37
- [7] 张云龙等. 口服去痛片引起急性溶血. 江苏医药, 1983; 9(9): 28
- [8] 杨贤俊等. 去痛片依赖性致铁粒幼细胞性贫血 1 例报告. 药学情报通讯, 1994; 12(3): 20
- [9] 张家华. 去痛片致药物免疫性溶血性贫血 1 例. 中华内科杂志, 1995; 34(7): 455
- [10] 孙琳等. 药源性粒细胞减少症 20 例临床分析. 临床医学, 1994; 14(4): 230

## 谷氨酸钠注射液引起不良反应 1 例报道

任守华

(解放军第 302 医院 北京 100039)

患者侯某, 男, 48a, 患肝炎后肝硬化, 合并腹水、肝性脑病。住院治疗, 输注完六合氨基酸注射液后, 改输 28.75% 谷氨酸钠注射液, 20ml 谷氨酸钠加入 5% 葡萄糖注射液 200ml 中滴注, 滴速 70gtt/min。开始无不适反应, 10min 后, 病人自觉恶心, 同时左上唇迅速出现一个约 1.5×2.5cm 的肿块, 无痛、痒感, 迅即减慢滴速为 40gtt/min, 30min 后恶心消失, 上唇肿块慢慢消退。继续以慢速

滴入, 直至滴完, 病人未再出现不适。次日再以 70gtt/min 的滴速输注谷氨酸钠注射液, 重又出现上述症状, 滴速减至 30~40gtt/min, 反应即消失。

讨论: 谷氨酸钠注射液是治疗肝性脑病的常用药, 不良反应很少出现。上述不良反应是一种不典型的过敏反应, 与病人的特异体质有关。其他病人快速滴注谷氨酸钠注射液均未出现不良反应, (下转第 219 页)