

胜の素致浅昏伴精神异常 1 例

刘安祥

(解放军第 289 医院 山西侯马 043014)

患者王某,女,42a,1996年12月20日22时服胜の素(情の素,日本东京久本汉方药株式会社制药)1粒,1h后突然出现恶心,呕吐呈非喷射状,呕吐物为胃内容物,继之四肢发软、神志恍惚不清,于次日2h在地方私人诊所予以肌注“解毒药”(具体不详),效果不佳,8h来院诊治,门诊首先给予清水洗胃,后入院治疗,病案号65806。查体:T 37.2℃、P 115次/min、R 20次/min、BP 24/16kPa,发育正常,营养中等,浅昏迷,查体不合作,周身皮肤未见黄染、皮疹、出血点,浅表淋巴不大,双肺呼吸音粗,肝、脾、肾未触及,双侧巴氏征(+),脑膜刺激征(-)。检验:K⁺3.7mmol/L、Na⁺140mmol/L、Cl⁻107mmol/L、Ca²⁺2.45mmol/L、CO₂CP 22mmol/L、BUN3.57mmol/L,血糖6.8mmol/L, WBC 11×10⁹/L。心电图示窦性心动过速,头颅CT扫描正常。患者发病前未服其它任何药物和特殊食物及接触其它有害过敏物

品,只单服胜の素(日本情の素),故诊断为胜の素中毒所致。临床给予吸氧、促醒、利尿、保肝和其它对症治疗用药。首先给予纳络酮注射液0.8mg、清开灵注射液40ml、胞二磷胆碱注射液0.5g,分别加入10%葡萄糖注射液200ml,静滴,qd。另外还给予20%甘露醇250ml,静滴,qd。速尿40mg、肝太乐注射液1g及能量合剂加10%葡萄糖液静点,qd。同时给予高压氧治疗,经治疗12d,患者神志基本清晰,但由于左侧肢体活动度低,精神症状明显(烦躁、哭喊等),继续进一步对症治疗,20d后,患者痊愈出院。

胜の素(情の素)系日本医药科学新发明的性欲兴奋剂,服后能使人体循环加速,进而令性荷尔蒙分泌增多,对男女性活动有促进、活跃、加强之效。本例患者仅服日本情の素1粒后在1h左右就致昏迷、烦躁等精神症状,不知何原因造成。建议广大群众为确保自身安危,不要滥服用任何药物。

地奥心血康致皮肤瘙痒症 2 例报道

郭风文

(解放军第 151 医院 安阳 455000)

地奥心血康作为一种新型心血管疾病治疗药,目前临床应用已很广泛,预防和治疗冠心病、心绞痛、心肌缺血、心律失常等心血管病,具有疗效高、作用快、副作用少等特点。笔者于1996年发现地奥心血康引起阵发性皮肤瘙痒症2例,现报道如下:

例1:男,49a,于1996年10月因胸痛胸闷,入我院一内科治疗,经检查诊断为冠心病、心律失常。按医嘱服用地奥心血康、维生素C、维生素E进行治疗,地奥心血康胶囊由中国科学院成都生物研究所制药厂生产,批号-940804。(下转第379页)