

## 安痛定注射液临床应用中的不良反应

杨丽英

(北京清华大学医院 100084)

安痛定注射液每 2ml 中含氯苯比林 0.1g,安替比林 0.04g,巴比妥钠 0.02g 用于发热头痛、关节痛、痛经等,是临床上常用的解热镇痛药,因其价廉、有效、不良反应少,基层医院广泛使用。但在临床使用过程中,其不良反应时有发生,现将安痛定注射液的不不良反应综述如下,以引起同行们的注意。

### 一、致全身震颤

李树森<sup>[1]</sup>报告 1 例 45a 女患者,因患上感发热,肌注吗啡 10mg,安痛定 4ml。10min 后自诉心慌、恶心。查体见面色苍白,体温 39℃,心率 92 次/min,律整,四肢和面唇肌肉迅速震颤,呼吸急促 32 次/min,血压 130/82 毫米汞柱,神色清,针刺入中,涌泉,20min 后反应消失,午后因体温仍高达 38.5℃,又肌注安痛定 4ml,10min 后又出现上述症状,经针刺入中、涌泉和耳针肾上腺穴后,症状很快消失。

### 二、致死

王卓民<sup>[2]</sup>报道一男性患者,30a。因腰痛肌注安痛定 2ml,1min 后出现呼吸困难,口唇紫绀。立即给予肾上腺素 1mg 皮下注射,并送医院抢救,半小时后死于途中。

### 三、致精神失常

林伙水<sup>[3]</sup>报告一 6a 女患儿,因发热、咽痛 3a 在当地就医,拟诊急性扁桃体炎。经肌注庆大霉素等治疗后,渐好转,但于次日晚 12h 又高热至 40℃,当时神志清楚,精神正常,无谵语及惊厥等。当夜约 12 时 30 分急诊时肌注安痛定 1.2ml,庆大霉素 4 万 U,约 20min 后,患儿出现精神失常,胡言乱语,定向障碍,伴出汗少许,无呕吐、抽搐等。查体:

双侧瞳孔等大。咽红,双侧扁桃体肿大,充血。颈软。心、肺、腹(-)。神经系统检查未引出病理征。当时未行处理,密切观察,精神症状持续约 3h 后患儿渐安静入睡,次日晨患儿醒后精神完全恢复正常。经观察数日未再出现精神症状。患儿既往无类似发病史,无高热致谵妄、惊厥史,以往未曾使用过安痛定。家族中无精神病史。

### 四、致咽喉水肿

梁乾玲<sup>[4]</sup>报告一女患者,33a,因患慢性腰腿痛前来门诊,肌注安痛定 2ml,注射后不久即出现心悸、头晕、喉头紧塞感,气促、呼吸困难、张口呼吸、语音不清、恶心、呕吐,即入观察室紧急处理。

查体:神清,颜面潮红,颈及下颌皮肤红肿,口腔粘膜充血++,咽充血+++,水肿,舌系带水肿,血压 150/90 毫米汞柱,经药物治疗,症状消失,血压正常,康复出院。

### 五、引起龟头糜烂

郭晓玲<sup>[5]</sup>报道 2 例因肌注安痛定过敏引起龟头糜烂患者。

例 1,男,47a,因感冒发热,肌注安痛定、柴胡注射液各 4ml,2h 后感龟头瘙痒,后因体温未降故又肌注上二药各 4ml,1h 后,龟头奇痒难忍,次日龟头局部水肿、渗出,继之糜烂。给予抗炎、抗过敏药物口服及局部处理,1wk 糜烂面愈合。追问病史,患者两年前因感冒曾服用过去痛片,也出现过上述反应,但不甚明显,考虑是去痛片的某种成分过敏所致。

例 2,男,13a,因急性扁桃体炎伴发热,给予青霉素 80 万 U,皮试阴性后加安痛定 2ml 肌注,4 小时后龟头出现瘙痒,下午 4 时

因体温仍高,又重复上二药肌注,2h 后龟头奇痒难忍,继之红肿,糜烂,因青霉素皮试阴性,故考虑为安痛定过敏,停用安痛定。经药物治疗及局部处理。10d 后龟头糜烂面结痂、愈合。

#### 六、引起药疹后并急性再障

刘正光<sup>[6]</sup>报告一女患者,84a。因发热及出现皮疹 1wk 周入院。发病前 1wk 曾肌注过安痛定 2ml。皮肤科情况:全身散在黄豆至蚕豆大暗红色斑疹,膝关节部有少许紫癜。查 RBC $1.56 \times 10^{12}/L$ , WBC $0.6 \times 10^9/L$ , 血小板  $11 \times 10^9/L$ 。骨髓检查报告:急性再障。治疗无效,于入院后 8d 因内出血、肾功能衰竭及呼吸循环衰竭而死亡。

#### 七、致大泡样皮疹

张爱兰等<sup>[7]</sup>报告 1a 女孩,因上呼吸道感染,高烧,肌注安痛定 0.7ml,0.5h 后患儿全

身出现大泡样皮疹,皮疹周围出现红斑,并有灼烧感,患儿哭闹不止。考虑系安痛定所致,立即肌注扑尔敏 2mg,口服强的松 5mg,维生素 C 0.1g,0.5h 后患儿瘙痒明显减轻,皮疹开始消失。

#### 参考文献

- [1]李树森. 肌注安痛定致全身震颤 1 例. 实用护理杂志, 1986;2(8):40
- [2]王卓民. 肌注安痛定致死 1 例. 中级医刊,1992;27(10):62
- [3]林伙水. 肌注安痛定致精神失常 1 例. 福建医药杂志, 1986;8(4):61
- [4]梁乾玲. 肌注安痛定致咽喉水肿 1 例. 实用医学杂志, 1989;5(5):36
- [5]郭小玲. 安痛定过敏引起龟头糜烂 2 例报告. 新医学, 1995;26(8):444
- [6]刘正光. 安痛定引起药疹合并急性再障 1 例. 临床皮肤科杂志,1995;24(6):356
- [7]张爱兰、孙海燕、王惠萍. 安痛定致大泡样皮疹 1 例. 西北药学杂志,1996;11(5):203

## 丁卡因表面麻醉致不良反应 1 例

马 锐 李文英 刘会臣 王录叶  
(解放军第 256 医院 河北 050800)

丁卡因亦称地卡因,是一种长效局部麻醉药,其表面穿透力强,麻醉作用快,维持时间长,被广泛地应用于五官科、妇产科、泌尿科手术的表面麻醉。我院美容室自 1989 年开展美容服务业务以来,一直用其作表面麻醉行纹眉纹眼线等,效果满意。现发生过敏反应 1 例,报告如下:

药品:1%丁卡因溶液(本院普通制剂室配制,批号 961026);眼线膏(美佳娜色素,由美佳娜有限公司生产)。

患者李某,女,30a,我院护师。既往身体健康,曾有青霉素过敏史。于 1997 年 1 月 28 日上午在我院美容室纹眼线。先用棉签蘸取 1%丁卡因液涂擦左眼上下眼睑。约 10min 后,患者感到左眼球发痒,未作处理,即得以

针蘸眼线膏作针刺上下眼睑行纹眼线的美容手术。术中,患者主诉左眼球有酸胀感。术毕,出现畏光、流泪、眼球酸胀感加剧,用冰块冷敷左眼以减轻症状。同法行右眼手术,同样出现上述症状。

术后约 45min 后,患者出现心悸、头晕、恶心、呕吐;术后约 2h,眼球出现刺痛。翻眼睑检查发现:双眼巩膜严重充血,并散在布满丘疹样小泡,瞳孔散大。

对症处理:口服扑尔敏片 8mg,维生素 C 片 0.2g, tid; 静滴 10% 葡萄糖加维生素 C 2.0g, bid; 局部应用四环素可的松眼膏,每小时点双眼 1 次。次日症状稍有减轻;第三天,症状明显好转,但巩膜仍有充血,视物模糊;第四天下午痊愈。