

因体温仍高,又重复上二药肌注,2h 后龟头奇痒难忍,继之红肿,糜烂,因青霉素皮试阴性,故考虑为安痛定过敏,停用安痛定。经药物治疗及局部处理。10d 后龟头糜烂面结痂、愈合。

#### 六、引起药疹后并急性再障

刘正光<sup>[6]</sup>报告一女患者,84a。因发热及出现皮疹 1wk 周入院。发病前 1wk 曾肌注过安痛定 2ml。皮肤科情况:全身散在黄豆至蚕豆大暗红色斑疹,膝关节部有少许紫癜。查 RBC $1.56 \times 10^{12}/L$ , WBC $0.6 \times 10^9/L$ , 血小板  $11 \times 10^9/L$ 。骨髓检查报告:急性再障。治疗无效,于入院后 8d 因内出血、肾功能衰竭及呼吸循环衰竭而死亡。

#### 七、致大泡样皮疹

张爱兰等<sup>[7]</sup>报告 1a 女孩,因上呼吸道感染,高烧,肌注安痛定 0.7ml,0.5h 后患儿全

身出现大泡样皮疹,皮疹周围出现红斑,并有灼烧感,患儿哭闹不止。考虑系安痛定所致,立即肌注扑尔敏 2mg,口服强的松 5mg,维生素 C 0.1g,0.5h 后患儿瘙痒明显减轻,皮疹开始消失。

#### 参考文献

- [1]李树森.肌注安痛定致全身震颤 1 例.实用护理杂志,1986;2(8):40
- [2]王卓民.肌注安痛定致死 1 例.中级医刊,1992;27(10):62
- [3]林伙水.肌注安痛定致精神失常 1 例.福建医药杂志,1986;8(4):61
- [4]梁乾玲.肌注安痛定致咽喉水肿 1 例.实用医学杂志,1989;5(5):36
- [5]郭小玲.安痛定过敏引起龟头糜烂 2 例报告.新医学,1995;26(8):444
- [6]刘正光.安痛定引起药疹合并急性再障 1 例.临床皮肤科杂志,1995;24(6):356
- [7]张爱兰、孙海燕、王惠萍.安痛定致大泡样皮疹 1 例.西北药学杂志,1996;11(5):203

## 丁卡因表面麻醉致不良反应 1 例

马 锐 李文英 刘会臣 王录叶  
(解放军第 256 医院 河北 050800)

丁卡因亦称地卡因,是一种长效局部麻醉药,其表面穿透力强,麻醉作用快,维持时间长,被广泛地应用于五官科、妇产科、泌尿科手术的表面麻醉。我院美容室自 1989 年开展美容服务业务以来,一直用其作表面麻醉行纹眉纹眼线等,效果满意。现发生过敏反应 1 例,报告如下:

药品:1%丁卡因溶液(本院普通制剂室配制,批号 961026);眼线膏(美佳娜色素,由美佳娜有限公司生产)。

患者李某,女,30a,我院护师。既往身体健康,曾有青霉素过敏史。于 1997 年 1 月 28 日上午在我院美容室纹眼线。先用棉签蘸取 1%丁卡因液涂擦左眼上下眼睑。约 10min 后,患者感到左眼球发痒,未作处理,即得以

针蘸眼线膏作针刺上下眼睑行纹眼线的美容手术。术中,患者主诉左眼球有酸胀感。术毕,出现畏光、流泪、眼球酸胀感加剧,用冰块冷敷左眼以减轻症状。同法行右眼手术,同样出现上述症状。

术后约 45min 后,患者出现心悸、头晕、恶心、呕吐;术后约 2h,眼球出现刺痛。翻眼睑检查发现:双眼巩膜严重充血,并散在布满丘疹样小泡,瞳孔散大。

对症处理:口服扑尔敏片 8mg,维生素 C 片 0.2g, tid; 静滴 10% 葡萄糖加维生素 C 2.0g, bid; 局部应用四环素可的松眼膏,每小时点双眼 1 次。次日症状稍有减轻;第三天,症状明显好转,但巩膜仍有充血,视物模糊;第四天下午痊愈。

讨论:该患者在手术中共使用两种药物,发生过敏反应,就可能有两种过敏源引起。经针蘸眼线膏刺前臂试验,排除其为过敏源的可能。因此,可以确定,不良反应是由丁卡因引起。

临床上关于丁卡因不良反应的报道很多,最常见的就是过敏反应和心血管毒性反应。近来报道其能引起速发性角膜损伤<sup>[1]</sup>;

口腔粘膜疱疹<sup>[2]</sup>,但引起巩膜丘疹样病变而致眼球针刺样疼痛还未见报道。所以,在今后的眼科应用中要引起足够的重视

#### 参考文献

- [1]冯俊仁.地卡因引起速发性角膜损伤1例.眼外伤职业病杂志,1995;17(2):138  
[2]黄秀云.丁卡因致口腔粘膜疱疹.新医学,1995;26(10):520

## 健脑合剂致过敏反应 1 例

黄 纯 王 瑜

(解放军第 175 医院 漳州 363000)

健脑合剂是我院自制中药煎剂,由五味子、六棱菊、牡蛎等药物组成,具有镇静安神、补肝肾、助睡眠之功效。是我院治疗神经衰弱、头痛及脑外伤后遗症等一线药物。经过 20 十多年的临床应用,疗效确凿,无任何药害事件报告。本文报告 1 例健脑合剂引起的过敏反应。

患者,女,64a。1997 年 2 月 3 日,因神经衰弱不能入睡来我院就诊,主诉:连续 4d 失眠,乏力。查体:形容倦怠,其它正常。患者既往有心脏病、高血压,无过敏史。处方健脑合剂 50ml(自制,961218),qd,睡前服。服药

后 30min,患者口腔、咽部粘膜出现水肿,双舌、两侧腮腺出现胀痛,流涎不止,畏寒、寒颤,继而高热 38.8℃。当天晚上再次来院急诊,疑诊“上感”住院进行对症治疗,d2 症状自行消失,未怀疑健脑合剂所致的过敏反应。15 日再次服用健脑合剂 50ml 后重复上述类似症状。即给予扑尔敏等抗过敏药物,2h 后症状缓解。

健脑合剂的不良反应十分罕见,也许与过去观察工作薄弱有关。该病例两次服用健脑合剂后,均出现过敏症状,期间未服用其它药物,可肯定为健脑合剂致过敏反应。

(上接第 117 页)

1. 出错后按提示退出,重新进入。
2. 仔细查找错误原因并修正。

#### (二)数据有误

1. 如果出错前不久曾进行过备份,则可将数据重装。

2. 错误应尽可能避免。个别已形成错误的出入库,应采用特定标志的出入库方式进行补救,并在月底或年终统计分析时滤出或减去,保证数据的真实性。

例:错误的出库应按原入库价退货入库,进行出库分析时减去这部分出库,进行入库分析时滤出退货入库的入库部分即可。错误的入库同样可采用类似的办法。

新的《药材供应管理系统》给我们创造了一个良好的人机环境。我们只有通过实践,吃透该系统的结构和思路,结合本单位的实际情况积极摸索和开发,使该系统的管理思想与我们的实际工作有机的结合,发挥其潜在的功能,为全军药材的统一科学管理服务。