

抗炎治疗(海南省海灵制药厂产品,批号960822,按说明要求操作)配合舒喘灵止咳平喘、氢氯噻嗪利尿消肿,未出现异常。d2,静滴拉氧头孢钠,当滴至50ml左右时,患者出现胸闷、寒颤、继而高热达39℃,口唇紫绀,四肢湿冷,神志不清,呼吸急促,BP16/10kPa,心率116次/min,心律不齐,同时SGPT升高,立即停药给予吸氧、保暖,并肌注肾上腺素1mg,氟美松10mg加入5%葡萄糖静滴,约45min后症状好转,高热渐退,口唇逐转红润,后改用替硝唑0.2g静滴,4d后炎症得到控制,SGPT消失。痊愈出院,随访半年未复

发。

二、讨论

拉氧头孢钠注射液临床上主要对革兰氏阴性菌和厌氧菌感染有较强的抗菌作用,对支气管炎、肺炎、脓胸及消化道感染和腹腔内感染有特效,其副作用为荨麻疹、搔痒等,但出现过敏性休克则实属罕见。分析:(1)出现上述症状符合拉氧头孢钠致过敏性休克;(2)可能与静滴过程中的速度快慢有关;(3)与患者的个体差异有关。建议临床应用中引起密切关注。

蛇六谷煎煮不当引起口唇发麻 1 例

吴佳琪 袁建珍 张 纯

(第二军医大学长征医院 上海 200003)

病例 患者女,65a,退休工人,1997年4月2日因患胃癌来我院中医科就诊,中医师给其开出汤剂处方,全蝎6g、蜈蚣3条、地龙10g、地鳖虫9g、天龙10g、蛇六谷20g、蛇莓30g、凌霄花30g、炒鸡金15g、黄芪30g、五倍子3g、沉香3g、陈皮9g、炙甘草6g、大枣七枚。共14贴,每日煎服1贴。3d后患者来院反应:服药数十分钟后感到咽喉灼热,口唇发麻。询问其煎药方法,发现患者将蛇六谷仅先煎20min。医生嘱其将蛇六谷先煎1h,病人按医嘱煎服后,未发现上述不良反应。

讨论 蛇六谷学名为华东菟蕈,系天南星科植物疏毛魔芋(*Amorphophallus Sinensis Belval*)的新鲜或干燥的块茎。此药性温,辛,有毒。具有化痰散积,行瘀消肿之功效。临

床上多以它配方组药治疗多种瘤体。蛇六谷生食有强烈的刺激作用。《开宝本草》中记载“生莠头,戟人喉出血”。因此,本品入药时必须先煎去毒。《本草纲目》中曾记载此药在炮制时必须换水更煮五六遍方可。依照《中药大辞典》用法要求蛇六谷须先煎2h,取汁,不可误食药渣。本例患者将蛇六谷仅先煎20min,还不足以去毒。致患者服药后出现口唇发麻等中毒症状。但在延长蛇六谷煎煮时间后,其中毒症状消失,说明此药煎煮不当是引起口唇发麻的主要原因。因此,在调配含有蛇六谷处方时必须嘱病家将蛇六谷先煎1~2h,并注意服法。另外,在服用含有蛇六谷汤药时,若出现口唇发麻等中毒症状,可用食用醋加生姜汁少许内服或含漱来解毒。