

新型情绪稳定新药:黛安神

鲁晓燕

(山东省单县中心医院 山东单县 274300)

黛安神(deanxit)为复方制剂,每片含三氟噻吨(flupentixol)0.5mg,四甲萘丙胺(melitracen)10.0mg。

一、药理作用

小剂量三氟噻吨主要作用于突触前膜多巴胺自身受体(D₂受体),促进多巴胺的合成和释放,使突触间隙中多巴胺的含量增加。黛安神可提高突触间隙多巴胺、去甲肾上腺素及5-羟色胺(5-HT)等多种不同的神经递质的含量,调整中枢神经系统的传导功能;四甲萘丙胺可以抑制突触前膜对去甲肾上腺素及5-HT的再摄取作用,提高突触间隙的单胺类递质的含量。黛安神对去甲肾上腺素再摄取的抑制作用比四甲萘丙胺弱;黛安神中的四甲萘丙胺可以对抗三氟噻吨大剂量时可能产生的锥体外系症状。

二、药动学

口服三氟噻吨或四甲萘丙胺均可在大约4h达血浆峰浓度。三氟噻吨的生物半衰期约为35h,而四甲萘丙胺约为19h。二者合用并不影响其单独的药动学特性。

三、适应症

神经官能症、神经衰弱、慢性疲劳综合症、焦虑性神经症、心脏神经官能症、胃肠神经官能症等。植物神经功能紊乱。多种焦虑状态,包括反应性、更年期、经前期、嗜酒及药

瘾者的紧张焦虑状态。神经性头痛、偏头痛、紧张性疼痛(肌源性头痛)、三叉神经痛、幻肢痛、某些类型的顽固性疼痛及慢性痛症。

四、不良反应

在推荐的治疗剂量范围内,本品的副作用较少,少数病人治疗初期可能有轻微口干,继续治疗1~2wk即可消失。夜间服用本品可能影响睡眠。

五、禁忌症

心肌梗死的恢复早期,束支传导阻滞,未经治疗的闭角性青光眼。急性乙醇、巴比妥类药物及阿片中毒。用单胺氧化酶抑制剂的病人,2wk内不能使用本品。对兴奋或活动过多的病人不主张用本品。

六、注意事项

为避免影响睡眠,每天最后一次服药不应晚于下午4点;如病人已在服用镇静药物,则镇静药可逐渐减量停用,在与镇静剂并用时,应中午以前服本品,睡前服镇静剂;不宜与单胺氧化酶抑制剂合用;妊娠期及哺乳期妇女慎用。

七、用法与用量

成人:每天2片,早晨一次顿服或早晨及中午各服1片;严重病例:每天3片,早晨2片,中午1片,口服;老年患者:每天1片,早晨口服;维持剂量:每天1片,早晨口服。