

性性功能低下,乳房发育。其机制可能是与性激素的化学结构相似,而产生竞争性抑制作用。

### 9 解热镇痛药

此类药物中消炎痛、非那西丁、保泰松及阿司匹林长期大量应用都可能出现性功能障碍,其机制与抑制前列腺素的合成有关。

### 10 抗菌药

酮康唑、联苯苄唑、甲硝唑及灰黄霉素、头孢唑林钠、异烟肼、乙胺丁醇等都有导致性功能障碍的报道。

### 11 其他

除上述药物对男性性功能与乳腺有影响外,还有性激素、肾上腺皮质激素、脂肪乳剂、苯妥英、卡马西平、柳氮磺吡啶、拉米夫定、蛋白酶抑制剂、肝素、异维甲酸、麻醉性毒品、致幻剂以及部分中草药如藏茵陈、雷公藤等曾有报道会引起性功能紊乱,临床使用时要加以注意。

### 参考文献:

[1] 喻东山,余琳.精神药物和高催乳素血症[J].中国新药与

临床杂志,2004,23(12):893.  
 [2] 陆国才,袁伯俊.新一代抗精神分裂症药物奥平[J].中国新药杂志,1999,8(3):161.  
 [3] 严宝霞主编.临床药理学各论[M].北京:北京医科大学出版社,1999:221.  
 [4] 史美甫,郭涛,李明,等.21世纪精编临床用药必备[M].北京:中国科学技术出版社,2003:506~520.  
 [5] 龚亚林,田小芹.抗抑郁药的临床应用综述[J].中国药师,2004,7(2):149.  
 [6] 潘学田主编.中国药品实用手册[M].北京:石油工业出版社,2000:B298.  
 [7] 南达元,王祖承,顾牛范.抗焦虑药氯氟草乙酯[J].中国新药与临床杂志,2004,23(12):887.  
 [8] 胡纲英.血管紧张素 II 受体阻滞剂的临床研究现状[J].国外医药.内科学分册,2001,28(4):143.  
 [9] 林甲宜,徐结桂,顾车方,等.高血压药物治疗对男性性功能的影响[J].高血压杂志,2003,11(4):315.  
 [10] 陈龙英,陆华.非诺贝特致男性性功能障碍 1 例[J].中国现代应用药学,1997,14(5):62.  
 [11] 齐文健,路仁莲.辛伐他汀致勃起功能障碍 1 例[J].中国临床药学杂志,2004,13(2):112.  
 [12] 洪素琴.雷尼替丁引起男性性功能障碍 5 例[J].中国现代应用药学,2000,17(1):75.

收稿日期:2005-04-27

## 细辛脑注射液治疗毛细支气管炎疗效观察

岳彩连,王宝灿(山东省鱼台县人民医院,山东 鱼台 272300)

关键词 细辛脑注射液;毛细支气管炎;疗效观察

中图分类号:R974 文献标识码:A 文章编号:1006-0111(2005)04-0215-02

解除呼吸道阻塞、改善通气、控制憋喘是提高毛细支气管炎疗效的关键<sup>[1]</sup>。用细辛脑注射液辅助治疗毛细支气管炎,国内未见报道。本文用细辛脑注射液辅助治疗毛细支气管炎 38 例收到理想的效果。现总结报告如下:

### 1 临床资料

选择我院自 2003 年 10 月至 2005 年 1 月确诊为毛细支气管炎住院的患儿 68 例,均符合《实用儿科学》制定毛细支气管炎的诊断标准<sup>[2]</sup>。临床表现

为发病突然,以咳嗽、憋喘为主,早晨及夜间较重,呼吸困难,双肺可闻及哮鸣音及细湿性罗音,有的发热。血 WBC 正常或偏高。X 线双肺纹理增粗,有的可见点片状影。我们将 68 例患儿按单纯随机抽样法分为两组即治疗组及对照组,治疗组 38 例,男 21 例,女 17 例,年龄 <3 月 10 例,~6 月 20 例,~1 岁 7 例,~2 岁 1 例,平均入院时间 3d,对照组 30 例,年龄、性别、临床表现及平均入院时间与治疗组相似。

### 2 方法

2.1 给药方案 对照组给予菌必治、病毒唑、氨茶碱等抗感染及对症综合治疗,并发心力衰竭者给予

作者简介:岳彩连(1963-),男,主管药师.Tel:0537-6383901,E-mail:ytxyy05@126.com

强心剂治疗,治疗组在此基础上加用细辛脑注射液(桂林南药股份有限公司生产)辅助治疗,一次0.5mg/kg,用5%或10%葡萄糖注射液稀释,静脉点滴,2次/d,疗程4~6d,观察两组临床症状、体征变化。

**2.2 疗效评价** 治疗组:显效是指用药治疗3d内咳嗽症状明显减轻、肺部罗音消失;有效是指治疗6d内咳嗽症状消失,肺部听诊无异常;无效是指用药超过6d症状、体征无明显改善或加重。记录两组显效、有效、无效例数。

**2.3 统计学处理** 采用卡方检验、*t*检验,以 $P < 0.05$ 为差异有显著性。

### 3 结果

治疗组显效14例、有效23例、无效1例,疗程平均6d,有效率97.4%;对照组显效7例、有效18例、无效5例,疗程平均8d,有效率80%。两组有效率有显著性差异( $\chi^2 = 4, P < 0.05$ ),细辛脑注射液的治疗组疗效明显优于对照组。治疗组平均住院天数(6d)明显短于对照组(8d),统计学意义显著( $t = 2.98, P < 0.05$ )。通过临床观察该药无明显的不良反应。

### 4 讨论

毛细支气管炎是一种常见的呼吸道疾病,主要是由呼吸道合胞病毒感染引起。本病发病急,进展快,喘憋明显,有时可并发心力衰竭,必须及时治疗。

病变主要累及毛细支气管炎,由于支气管黏膜水肿、黏液分泌物增多,造成支气管狭窄,临床表现憋喘明显。近年来研究报道,毛细支气管炎憋喘可能与支气管平滑肌收缩有关。尤其是早期或轻症,支气管收缩明显、分泌物阻塞较轻者,应用支气管扩张剂,效果虽不如哮喘明显,但仍有一定的疗效<sup>[3]</sup>。细辛脑注射液具有对抗乙酰胆碱作用,减少了乙酰胆碱与受体的结合,降低了迷走神经张力,使支气管平滑肌痉挛缓解,支气管内分泌物减少,起到了改善通气、平喘作用;它能够对咳嗽中枢有较强的抑制作用,使咳嗽症状减轻;它能够使痰液变稀,利于痰液排出,有利于病情的恢复。通过本组细辛脑注射液的临床应用,毛细支气管炎的治疗组有效率明显高于对照组,使毛细支气管炎咳嗽、憋喘等症状明显减轻、体征明显好转,病程明显缩短,并未发现明显的毒副作用。该药价格低廉、有效、安全,值得临床上推广应用。

### 参考文献:

- [1] 廖碧玲. 雾化吸入辅治毛细支气管炎44例疗效观察[J]. 右江医学,2000,28(4):257.
- [2] 吴瑞萍,胡亚美,江载芳. 诸福棠实用儿科学[M]. 第6版 北京:人民卫生出版社,1996:1165.
- [3] Goebel J, Estrada Bouinonez J. Prednisolone plus albuterol versus albuterol alone in mild to moderate bronchiolitis[J]. Clin Pediatr, 2000,39(4):213.

收稿日期:2005-05-12

## 脉平片治疗冠心病心绞痛的临床疗效观察

陈 勇 (重庆市永川市人民医院内二科,重庆 402160)

**摘要** 目的:观察脉平片治疗冠心病心绞痛的疗效。方法:78例经确诊为冠心病心绞痛患者,随机分为脉平片治疗组40例,硝酸异山梨酯对照组38例,前者给予脉平片4片,每日3次,对照组给予硝酸异山梨酯(消心痛)片10mg,3次/d,3周为1疗程,观察心绞痛发作频率和减少硝酸甘油消耗量,心电图,血脂等指标。结果:脉平片可显著降低心绞痛发作频率和减少硝酸甘油用量,心绞痛症状改善率达82.5%,并改善心绞痛分级;显著改善心电图NST,ΣST,心电图疗效为55.0%,明显减少心肌缺血时间;其疗效与硝酸异山梨酯相仿,具有明显的调节血脂作用。结论:脉平片对冠心病心绞痛的治疗疗效确切,值得临床推广应用。

**关键词** 脉平片;冠心病;心绞痛;硝酸异山梨酯

中图分类号:R972

文献标识码:A

文章编号:1006-0111(2005)04-0216-03

作者简介:陈勇(1968-),男,医学学士,主治医师。Tel:13608381200, (023)49800283(H)

冠心病心绞痛是由于冠状动脉粥样硬化和冠状动脉功能性改变(痉挛)导致心肌暂时性缺血缺氧而引起的发作性胸痛或胸部不适为表现的临床综合